

Frau
Sarah LUEF
Hasnerstraße 124B/1412
1160 Wien

Wiener Gesundheitsverbund
Klinik Ottakring
Akut-Ambulanz
Vorstand: Vorstand Prim.a Priv.Do.z.in Dr.in Beate
Schrack, MSc, PhD
1160 Wien, Montleartstraße 37
Tel.: +43/01/491500/
Fax: +43/
E-Mail:
<https://klinik-ottakring.gesundheitsverbund.at>

Ambulanter Patientenbrief

Wien, 11.11.2025
vidiert

Frau **Sarah Luef**, geboren am **28.12.1998**, **SV-Nr. 3507-281298**, hat am 10.11.2025 unsere Akut-Ambulanz besucht.

Konsultations- oder Überweisungsgrund:

Frau Luef wird mit der Rettung zur ambulanten Begutachtung vorstellig.

Anamnese:

VE:

- St.p. Magenbypass
- Operation nach Elmslie Trillat vom 06.09.2020 Knie links

Status, Diagnostik und Befunde:

Wach, klar, zeitlich, örtlich, situativ und zur eigenen Person orientiert, Kontaktverhalten freundlich zugewandt, Aufmerksamkeit, Konzentration und Auffassungsfähigkeit ungestört, Merk- und Gedächtnisfähigkeit unauffällig, Gedankengang kohärent, Tempo in der Norm, Inhaltlich unauffällig, Wahrnehmung unauffällig, keine Ich-Störungen, Stimmungslage über den Tag stark schwankend, Affizierbarkeit in beiden Skalenbereichen vorhanden, Antrieb unauffällig, keine psychomotorischen Störungen, Schlaf ungestört, Suizidgedanken werden klar und glaubhaft negiert, selten SVV (Beißen, Kratzen), SVV und SMV in der Jugend, Binge Eating, zukunftsorientiert (Job, Dipolm, Partner), kein Suchtverhalten, Impulskontrolle erhalten, Realitätsbezug, Kritikfähigkeit und Krankheitseinsicht gegeben, derzeit besteht kein Hinweis für eine akute, ernstliche und erhebliche Fremd- oder Selbstgefährdung.

Diagnose:

-V.a. kPTBS DD F60.3

Verlauf:

Eine stationäre Aufnahme lehnt die Patientin ab. Wir vereinbaren die Einstellung auf Quetiapin XR und einen Kontrolltermin h.o. am 13.11.2025 zur Reevaluierung der Dauermedikation und des weiteren Procederes.

Zusammenfassende Beurteilung:

Bei fehlenden UbG-Kriterien kann dem Wunsch nach einem ambulanten Procedere entsprochen werden.

Durchgeführte Maßnahmen:

-Entlastungsgespräch

-NEU:

-Seroquel XR 50MG 0-0-1-0, mit einer Stunde Abstand zu Mahlzeiten

-Quetiapin 25mg bis zu 3x/Tag bei hochgradiger Anspannung/Angst

-Mitgabe von 4x25mg Quetiapin zur bedarfsadaptierten Einnahme bei Anspannung, Mitgabe 4x Quetiapin 50 XR

Weitere empfohlene Maßnahmen:

-Kontrolle h.o. am 13.11.2025 um 12:00 Uhr

-FÄ Anbindung im niedergelassenen Bereich empfohlen.

-Psychotherapie weiter durch Mag. Natascha Ditha-Berger

-Bei akuter Verschlechterung ist eine Wiedervorstellung jederzeit möglich.

diktiert: Dr. Louise Spemann

Mit freundlichen Grüßen

Der Abteilungsvorstand

gesehen: Vorstand Prim.a Priv.Doiz.in Dr.in Beate
Schrack, MSc, PhD

vidiert: Vorstand Prim.a Priv.Doiz.in Dr.in Beate
Schrack, MSc, PhD